

Vaccinations contre la Covid-19 et la grippe 2026-2027

Le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination contre la grippe et la Covid-19 aux groupes cibles suivants :

- **Groupe 1** : personnes présentant un risque de complications liées à la grippe, c.-à-d. :
 - **Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ;**
 - les patients à partir de l'âge de 6 mois présentant :
 - une affection chronique des poumons (y compris l'asthme sévère), du cœur (à l'exception de l'hypertension), du foie ou des reins
 - une affection métabolique (y compris le diabète)
 - une affection neuromusculaire
 - un trouble de l'immunité (primaire ou acquis)
 - une obésité sévère avec un IMC ≥ 40
 - les personnes séjournant en institution ;
 - les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse ;
 - les enfants âgés de 6 mois à 18 ans sous traitement chronique par acide acétylsalicylique.
- **Groupe 2** : personnes travaillant dans le secteur des soins de santé, au sein ou en dehors d'un établissement de soins.
- **Groupe 3** : personnes vivant sous le même toit que (stratégie de vaccination en cocon) :
 - les personnes à risque du groupe 1 (à l'exception de l'entourage des femmes enceintes vaccinées avant l'accouchement) ;
 - les enfants de moins de 6 mois dont la mère n'a pas reçu de vaccin contre la grippe pendant la grossesse.

Pour les personnes âgées de 18 à 65 ans qui ne font pas partie des groupes cibles précités, il est recommandé d'évaluer la nécessité de la vaccination « **au cas par cas** ».

- Le CSS demande de tenir compte, chez les personnes âgées de 50 à 65 ans, de facteurs tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et/ou l'obésité lorsqu'il est décidé au cas par cas si un vaccin est nécessaire.
- **Le CSS ne recommande pas la vaccination systématique des adultes en bonne santé âgés de 18 à 65 ans.**

Chez les personnes âgées de **65 ans ou plus**, un **vaccin à haute dose** (Efluelda) est privilégié. Une prescription de votre médecin généraliste est nécessaire.

Il reste également possible de se faire vacciner avec le vaccin antigrippal « classique » (Vaxigrip, Influvac, Alpharix). Celui-ci offre également une bonne protection et ne nécessite pas de prescription de votre médecin généraliste.

Vous ne devez pas apporter le vaccin contre la Covid-19. En revanche, vous devez apporter vous-même votre **vaccin contre la grippe**.

Période recommandée pour la vaccination :

	<i>Octobre</i>		<i>Novembre</i>		<i>Décembre</i>		<i>Janvier</i>
	1-15	16-30	1-15	16-30	1-15	16-31	
Covid-19							
Grippe							

	Vaccination contre la Covid-19
	Vaccination contre la grippe
	Vaccination tardive contre la grippe
	Pic possible de Covid-19 / grippe